

	Pratiques sexuelles						Autres			
	Pénétration		Fellation	Cunnilingus	Anulingus	Caresse sexuelle	Embrasser	Échange seringue	Sniff	Mère/bébé (naissance)
	Vaginale	Anale								
Gonorrhée ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	◆				●
Chlamydia ⁽²⁾	●	●	◆	◆	◆	◆				●
Trichomonas ⁽³⁾	●		▲	▲	▲	◆				●
VIH/SIDA ^(3,4)	●	●	▲	▲		🩸		●		●
Syphilis ^(3,4)	●	●	●	●	●	●	▲	●		●
Hépatite A ⁽³⁾		●			●					
Hépatite B ⁽⁴⁾	●	●	●	●		🩸	◆	●	◆	●
Hépatite C ⁽⁵⁾	🩸	●				🩸		●	◆	▲
Herpès genital	●	●	●	●	●	●	▲			●
HPV ⁽⁶⁾ Papillomavirus	●	●	●	●	●	●				◆
Mycoplasme genitalium	●	●	▲	▲	▲	◆				◆

Type de risque :

- Fort
- ◆ Moyen
- ▲ Faible
- 🩸 Risque en présence de sang

Test à effectuer :

- 7 jours après la prise de risque (1)
- 2 semaines après la prise de risque (2)
- 6 semaines après la prise de risque (3)
- 8 semaines après la prise de risque (4)
- 12 semaines après la prise de risque (5)
- Utérus (col): frottis effectué tous les 3 ans. Anus et pénis: dépistage qu'en cas de symptômes apparents (6)

Type de prélèvement :

- Sang:** VIH/SIDA, Hépatite A, B et C, Syphilis
- Frottis:** Herpès, HPV, Trichomonas
- Frottis ou urine:** Chlamydia, Gonorrhée, Mycoplasme genitalium